Touriga Brasileira

Vass7R03s366-370



Collection Vassal-Montpellier

1483Mtp12

Laving Brain Paina Main

Touriga brasilevia u 4 R 3 s 366.370









NOM Touriga brasileira, EMPLACEMENT 7R3 5.366.370 ..

204037.0												
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 fr 3 } 4 } 5			153. 90		30		17.5	23-5	1817	23.7	30,7	20 =8,90
Pou	rritur	e : 0		Mill.	: 0	Port :	le	rige	Vigueur: 2/			

NOM Touriga braileria EMPLACEMENT 7 R3 x 366. 370

| South | S

ANNEE 1992

ANNEE 1992

NOM Touriga Brasileira EMPLACEMENT 7 R 3 1366, 370

136408 148312

Souche	Nbre yeux	Débout	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor	raison mi/f	fin	Vé début	raison mi/v	fin	Maturité	
1	2	19.5	23,3 4	2	7	18,5	21,5	26.5	21.7	25,7	9,7	2408	
2	+						- 4			0		+2	
3	f				Grappe : G - M - P Dim : AC Compacité: L - M C Pour : Mill : O								
4	f												
5	2	19.3	23.3	1	Baie: TG - G - M - P Dim: 19x17 disc-sph-11-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré								
	The state of the s	•											
	1	le 23.3	92		Saveur : s - m - ar - fox - herb								
	Dle 23.392 Pépins: avec - apyrène Port: 1 euge Vigueur: 2/												
		,			POLC .	new	cyl	_	194041				
			1										
					1								

N° d'ordre: 148312 Fouriga Brasileira
Désignation: 7R3A, 366-370 (0.5)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 100 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescante 180 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 2125 autres 213.

(Dans le cas cù la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face intérieure

Mervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 2/17 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux (2) - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 287 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 88

N° d'ordre: Fouriga Brasileira

Désignation: 7R30-366-3700.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

· Calvo 90

N° d'ordre : Désignation : Touriga Brasileira 7R3s-366-370s-5

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274) - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen [7] - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178 Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

-Calvo89

Fouriga Brasileira 7 R3 s. 366.370 (6.5) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (70) (dimensions 11 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73, A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 /- mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81/ Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 4 x 16). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91, Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoíde 99 - obovoíde 100 - cylindroíde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent [29]. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (134). A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 89

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Yeux

4

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7)
duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

> : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

- Calvo 90

```
N° d'ordre: 1964.08

Désignation: Touriga brasileira M

Emplacement: 7 R3 1 366.370
```

```
: 1 - (2) - (3)
Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                    : (7) - (8) - 9
L1/LD
                                    : (10) - 11
L2/L
                                   : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                              : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : (21) - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                          : (25) - 26 - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                          : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                   : 40 - 41
Dents : forme
                                  : (42) - 43 - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65
                                  : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92